

CRITERIOS DERIVACIÓN A FONOAUDILOGÍA PARA INIC INGESTA V.O.

**NO iniciar ingesta v.o. hasta cumplir estos criterios*

PACIENTE EN CPC – INTENSIVO o INTERMEDIO

PACIENTE NEUROLÓGICO

- 1. Pacientes con deterioro cognitivo – psicomotor previo.**
**Aún cuando familia refiera que come ok.*
- 2. Pacientes con compromiso cuantitativo de conciencia.**
- 3. Diagnóstico de patología neurológica aguda.**
- Vascular, infecciosa, TEC, Status, etc.
- 4. Paciente neurológicos crónicos, particularmente:**
- Demencia, Parkinson, Accidente vascular previo secuelado, postrados, ELA, Patología neuro-muscular.

*Excepciones neurológicas:

- TEC leve (GCS 14-15)
- Sincope
- Cefalea
- Crisis aislada con recuperación ad-integrum.
- ACV lacunar o NIHSS bajo (<5)
- ACV tipo TIA

PACIENTES INTUBADOS

≤ 3 días

> 3 días

Test de Vaso de Agua

Test (+)

Test (-)

OTROS PACIENTES

- 1. Antecedente de disfgia**
- 2. Antecedente de Neumonía aspirativa**
- 3. Cirugía Cabeza y cuello**
- 4. Sedación x BIC suspendida < 6 horas**
**Morfina, fentanyl, BZP, ketamina o DEX.*

PACIENTES > 70 AÑOS

Aplicar **EAT-10** al ingreso
Encargado: Nutricionista

Puntaje ≥ 3

Puntaje < 3
**Sin otros criterios de derivación*

INICIO
ALIMENTACION VÍA
ORAL POR EQUIPO
NUTRICIÓN

EVALUACIÓN DE DEGLUCIÓN POR FONOAUDILOGÍA
Definir régimen alimentación / inicio tratamiento deglución